

使用前に次の説明文を必ずお読みください。

かゆい水虫・たむしに

ダマリングランデアイスプレー

ダマリングランデアイスプレー

第2類医薬品

〈水虫・たむし用薬〉

⚠【使用上の注意】

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。

(2)湿疹。

(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3)乳幼児。

(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5)患部が顔面又は広範囲の人。

(6)患部が化膿している人。

(7)「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑（フケ、アカのような皮膚のはがれ）、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん*

*：全身に発現することもあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能】

水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に噴射塗布してください。

よく振ってお使いください。

正しい使い方



1. 容器を真下に向けて使用してください。上向きや横向きで使用すると、ガスだけが出て中身が残り、最後まで使用できなくなります。
2. 患部まで約3cmの距離で噴射してください。
3. 同じ箇所に連続して1秒をこえて噴射しないでください。(凍傷になるおそれがあります)

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。
- (6)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
- (7)使用前によく振り、真下に向けて噴射してください。
- (8)患部まで約3cmの距離で噴射してください。
- (9)同じ箇所に連続して1秒をこえて噴射しないでください。(本剤は冷却力が強いいため、過度の使用により凍傷になるおそれがあるため)

【成分】 60g中

テルピナフィン塩酸塩..... 240mg

リドカイン..... 480mg

グリチルレチン酸..... 120mg

l-メントール..... 240mg

添加物：ポリソルベート65、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(6E.O.)、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、セタノール、ヒドロキシプロピルセルロース、1,3-ブチレングリコール、BHT、エタノール、DME

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(品質保持のため)
- (5)火気に近づけないでください。
- (6)本剤は床、家具等の塗装面に付きますと変質させることがありますので、付着しないよう取扱いに注意してください。

火気と高温に注意

高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。

②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。

③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。

④火の中に入れていないこと。

⑤使い切って捨てること。

高压ガス：DME

●捨てる時は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜いてください。

火気厳禁 原液28mL(エタノール含有)

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

大正製薬株式会社²¹
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

—本文は、直接容器に記載されている事項です—