

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

## 使用上の注意

相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

皮膚：発疹／消化器：胃部不快感

(2) しばらく服用しても症状がよくなる場合。

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
下痢

## 効能

☆発熱性消耗性疾患・病中病後・食欲不振・栄養障害・肉体疲労・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

☆滋養強壮 ☆虚弱体質

## 用法・用量

成人(15才以上)1日1回1本(50mL)を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

[注意]

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。(他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください)

(2) 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

## 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。

(3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



**大正製薬株式会社**

東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<http://www.taisho.co.jp>

お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

●かぜなどの発熱で  
体力を消耗した時、  
病中病後などの栄養補給に

指定医薬部外品 50mL

# ゼナFO-ジンジャー

## 成分 1本(50mL)中

ショウキョウ(生姜)エキス・・・77.8mg  
(生姜700mgに相当)

ケイヒ(桂皮)流エキス・・・0.15mL  
(桂皮150mgに相当)

チンピ(陳皮)エキス・・・20mg  
(陳皮100mgに相当)

シャクヤク(芍薬)エキス・・・30mg  
(芍薬120mgに相当)

トウキ(当帰)流エキス・・・0.06mL  
(当帰60mgに相当)

カンゾウ(甘草)エキス・・・30mg  
(甘草120mgに相当)

タイソウ(大棗)エキス・・・120mg  
(大棗300mgに相当)

ニンジン(人参)エキス-P・・・85.8mg  
(人参600mgに相当)

タウリン・・・500mg

リボフラビンリン酸エステルナトリウム  
(ビタミンB<sub>2</sub>)・・・5mg

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>)  
・・・5mg

ニコチン酸アミド・・・20mg

添加物：白糖、クエン酸、クエン酸Na、  
ポビドン、ポリオキシエチレン硬化  
ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、  
香料、アルコール

(アルコール 0.12mL以下)

[注意] 本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB<sub>2</sub>によるもので、ご心配ありません。