

2013年2月 記載要領変更に伴う改訂

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



鎮痒消炎薬

タクトプラスゼリー

虫さされ、かゆみに

タクトプラスゼリーは…

- かゆみを抑えます
ジブカイン塩酸塩とジフェンヒドラミンの2種類の作用の異なる成分が虫さされやしっしんによるかゆみを抑えます。また、殺菌剤イソプロピルメチルフェノールが、かきこわしによる二次感染を防ぎます。
- 赤み、はれを抑えます
デキサメタゾン酢酸エステルが虫さされやしっしんによる赤み、はれを抑えます。
- スーッとします
清涼感のあるゼリータイプです。べたつかず、さわやかな使用感です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください

🗑️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

★裏面につづく



〔効 能〕

虫さされ、かゆみ、湿疹、かぶれ、皮膚炎、あせも、しもやけ、じんましん

〔用法・用量〕

1日数回適量を患部に塗布します。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

〔成分・分量と働き〕

成 分	分 量	働 き
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025%	湿疹、皮膚炎、かぶれなどの赤み、はれを抑えます。
ジフェンヒドラミン	0.5%	かゆみを抑えます。
シブカイン塩酸塩	0.3%	
イソプロピルメチルフェノール	0.1%	殺菌作用により細菌による感染を防ぎます。
l-メントール	3.5%	清涼感を与え、かゆみを鎮めます。
dl-カンフル	3.0%	

添加物として、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クロタミトン、アジピン酸ジイソプロピル、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシビニルポリマー、プロピレングリコール、アルコールを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号