



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

食べすぎ・飲みすぎ・はきけに

第3類  
医薬品

## サイシン<sup>®</sup>胃腸薬

ウルソデオキシコール酸配合 消化健胃薬

サイシン胃腸薬は…

ウルソデオキシコール酸に、3種の消化酵素、4種の健胃生薬を配合したサッと溶けてのみやすい細粒の消化健胃薬です。

食べすぎ、飲みすぎ、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき)などの不快な胃腸症状を改善します。

- 3種の消化酵素が、食物中の脂肪、タンパク質及びでんぷんなどの消化を促します。
- 4種の健胃生薬が、弱った胃腸の働きを回復させると共に、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき)などの症状を改善します。
- ウルソデオキシコール酸が、肝臓に働き、胆汁の分泌を促進し(利胆作用)、消化に時間のかかる脂肪の消化を助けます。



使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください



- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合

### 【効 能】

はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、もたれ(胃もたれ)、食べすぎ(過食)、飲みすぎ(過飲)、食欲不振(食欲減退)、胃弱、胸やけ、胸つかえ、嘔吐、消化促進、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感



食べすぎ・飲みすぎ



はきけ



胃もたれ



**〔用法・用量〕**

下記の1回服用量を1日3回、食前又は食後に服用します。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	3回
11~14才	$\frac{2}{3}$ 包	
8~10才	$\frac{1}{2}$ 包	
5~7才	$\frac{1}{3}$ 包	
5才未満	服用しないでください	

**〈用法・用量に関連する注意〉**

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

**〔成分・分量と働き〕 3包中(1包1g)**

成 分	分 量	働 き
ウルソデオキシコール酸	60mg	肝臓に働き、胆汁の分泌を促進し(利胆作用)、脂肪の消化を助けます。
ピオチアスターゼ1000	30mg	でんぷんやタンパク質の消化を助けます。(消化酵素)
リパーゼAP6	45mg	脂肪の消化を助けます。(消化酵素)
プロザイム6	15mg	タンパク質の消化を助けます。(消化酵素)
ケイヒ末	180mg	健胃生薬で、弱った胃腸の調子を整えます。
ウイキョウ末	180mg	
ゲンチアナ末	90mg	
ガジュツ末	60mg	

添加物として、L-メントール、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、乳糖を含有します。

**◎保管及び取扱い上の注意**

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03(5412)7393  
受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元  
**佐藤製薬株式会社**  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号  
製造販売元  
**テイカ製薬株式会社**  
富山県富山市荒川1丁目3番27号