



2013年11月記載要領変更に伴う改訂

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

鼻炎用内服薬

ストナリニ[®] フィルム

鼻炎(くしゃみ、鼻水、鼻づまり)に

- ストナリニフィルムは、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩やベラドンナ総アルカロイドを配合し、鼻水、くしゃみ、鼻づまりなどの鼻炎に伴う症状に効果をあらわします。
- 口の中でスーッと溶けるフィルム剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 15歳未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難、口中の乾燥
 - (6) 次の診断を受けた人。
緑内障、心臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

【効 能】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

【用法・用量】

下記の1回服用量を口中で溶かして服用します。ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1枚	3回
15歳未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) このフィルム剤は、以下のように服用してください。
 - ① 乾いた手指で開け口から両方向へ広げるように開き、フィルム剤を取り出します。（アルミシートごと飲み込まないでください。食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながるおそれがあります。）
 - ② 本剤は舌の上へのせ唾液で湿らせ、溶けた後唾液のみで服用することができます。また、水で服用することもできます。
- (3) このフィルム剤は口の中で溶けだしますが、万一、のどにはりついてしまった場合には水で流し込んでください。また、唾液が少なく服用しにくいときは水を口に含み、溶かしながら服用してください。
- (4) 本剤に濡れた手で触れないでください。



【成分・分量と働き】 3枚中

成 分	分 量	働 き
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどのアレルギー症状を抑えます。
ベラドンナ総アルカロイド	0.6mg	副交感神経に働いて、鼻みず、なみだ目を抑えます。

添加物として、ヒプロメロース、グリセリン、ショ糖脂肪酸エステル、アセスルファミンK、アスパルテム（L-フェニルアラニン化合物）、ℓ-メントール、セルロース、CMC-Na、香料、銅クロロフィリンNaを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) アルミシートや中身のフィルム剤が破損しないように、保管及び携帯に注意してください。
- (5) アルミシート開封後はすみやかに服用してください。
- (6) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
 電話 03(5412)7393
 受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元
佐藤製薬株式会社
 東京都港区元赤坂1丁目5番27号