

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

外皮用殺菌消毒剤

日本薬局方

日本標準商品分類番号
872615

消毒用エタノール「カネイチ」[®]

(消毒用アルコール)

貯法: 気密容器
室温保存
使用期限: 3年
(容器等に表示)

Ethanol for Disinfection

- 【特徴】 ●消毒用エタノールは一般的な細菌をすばやく殺菌します。
●消毒用エタノールは速乾性で、手にべたつき等残りません。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- (1) 次の部位には使用しないこと。
粘膜(口唇等)、目の周囲



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
 - 患部が広範囲の人
 - 深い傷やひどいやけどの人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - 本剤の使用により、皮ふに発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感等の症状があらわれた場合
- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

■効能・効果 創傷面の殺菌・消毒

■用法・用量 本液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽く塗る。

<用法・用量に関連する注意>

- 用法、用量を守ること。
- 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
- 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- 過度に使用すると、脱脂等による皮ふ荒れを起こすことがある。
- 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 外用にのみ使用し、内服しないこと。

■成分・分量 エタノール 76.9～81.4vol%を含有する。

■保管及び取扱い上の注意

- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
- 塗装された物等に使用した場合、色が落ちる恐れがあります。
- 使用期限が過ぎた製品は使用しないこと。
- 火気に近づけないこと。

■包装 500mL

■梱包 500mL×20本入

■製造販売元・消費者相談窓口

兼一薬品工業株式会社

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

〒555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号

TEL 06(6471)3548 FAX 06(6471)5659