

部:2014年2月改訂

この説明文書は使用前に必ずお読みください。また必要なく読めるように保存しておいてください。

消炎鎮痛プラスター〔微香性〕

セデス®VFR 第2類医薬品**!** 使用上の注意……してはいけないこと 

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (2) ぜんそくをおこしたことがある人
- (3) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (4) 15才未満の小児

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜など
- (2) しっしん、かぶれ、傷口
- (3) みずむし・たむしなどまたは化膿している患部

3. 連続して2週間以上使用しないでください

相談すること 

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)をおこしたことがある人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水泡

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれます。

製造番号

使用期限

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

……効能・効果……

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

……用法・用量……

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1~2cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状がおきないことを確かめしてから使用してください。
- (4) 患部の皮膚は清潔にし、汗などをよく拭き取ってから貼ってください。

……成分・分量……

膏体100g中に次の成分を含有しています。

成分	含量
フェルピナク	3.5g

添加物として 脂環族飽和炭化水素樹脂、流動パラフィン、l-メントール、ジソプロパノールアミン、その他3成分を含有しています。

……保管及び取扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、袋の口を折り返して、外気にふれないようにして保管してください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ 大阪 06-6209-6948
窓口 東京 03-3406-8450
受付時間 9時~17時(土、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931



箱

®:登録商標



販売元

塩野義製薬株式会社

大阪市中央区道修町3丁目1番8号

製造販売元

株式会社 大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地



4 987087 036152