

この説明文書は服用前に必ずお読みください。  
また必要なとき読めるように保存しておいてください。

3 部：2013年8月改訂

鼻炎によるくしゃみ・鼻みず・鼻づまりに

鼻炎用内服薬

第②類医薬品

# パイロン<sup>®</sup>99鼻炎内服液

シオノギ製薬

パイロン99鼻炎内服液は、外出先でも必要なときに服用できる携帯性にすぐれたスティック包装の液体鼻炎薬です。

5種類の成分を配合し、急性鼻炎または副鼻腔炎、花粉、ハウスダストなどアレルギー性鼻炎によるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどの諸症状にすぐれた効果を発揮します。のみやすい甘味のある内服液です。



## 使用上の注意 ……

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (2) 次の症状のある人  
前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人

高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など)、胃腸鎮痛鎮痙薬

#### 3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさなどの症状があらわれることがあります)

#### 4. 長期連用しないでください



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人
- (4) 高齢者
- (5) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (6) かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬などにより、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸をおこしたことがある人
- (7) 次の症状のある人 高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人 緑内障、腎臓病
- (9) モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩など)で治療を受けている人

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、 <u>けいれん</u>
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

(裏面につづく)

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿などがあらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください  
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
- 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

#### …… 効能・効果 ……

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：  
くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

#### …… 用法・用量 ……

次の量をおのみください。ただし、おのみになる間隔は約4時間おいてください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人（15才以上）	1 包	3～6回
15才未満	服用させないこと	

● 定められた用法・用量を厳守してください。

#### …… 成分・分量 ……

パイロン99鼻炎内服液は、澄明な褐色の内服液で、6包（10mL×6・大人1日最大量）中に次の成分を含有しています。

成 分	含量(6包中)	はたらき
d-クロルフェニラミン マレイン酸塩	6mg	アレルギー反応を抑制するとともに、毛細血管の拡張や、透過性を抑制し、くしゃみ・鼻みず・鼻づまりを改善する
塩酸プソイドエフェドリン	180mg	鼻粘膜の充血やはれをおさえ、鼻づまりをやわらげる
ベラドンナ総アルカロイド	0.6mg	鼻みずや、なみだが過剰に出るのをおさえる
グリチルリチン酸二カルシウム	40mg	鼻の粘膜の炎症を抑制し、鼻づまりをしずめる
無水カフェイン	150mg	頭が重い症状をすっきりさせる

添加物として 精製白糖、ハチミツ、クエン酸ナトリウム水和物、dl-リンゴ酸、クエン酸水和物、トレハロース、デキストリン、安息香酸ナトリウム、プロピレングリコール、カラメル、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、カルボキシメチルセルロースナトリウム、香料、エタノールを含有しています。

#### …… 保管および取扱い上の注意 ……

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- スティック開封時および服用時、液剤の飛び出しに注意してください。
- 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



#### …… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。  
塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」  
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450  
受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

®：登録商標

販売元

**塩野義製薬株式会社**  
大阪市中央区道修町3丁目1番8号

製造販売元

**株式会社 パナケイア製薬**  
富山県高岡市中田4576番地