

ビタミンCの補給に

第3類医薬品

ビタミンC主薬製剤

**シナール<sup>®</sup>EX顆粒****シオノギ製薬**

人は、体の中でビタミンCをつくることができないため、毎日摂取することが大切です。シナールEX顆粒は、ビタミンCの補給に適したビタミン剤で、口の中でさっと溶けるのみやすい顆粒です。またビタミンCとともに抗酸化作用をもつ天然型ビタミンEを配合しています。

**使用上の注意 ……****相談すること**

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐，胃部不快感，胃部膨満感，食欲不振

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

**…… 効能・効果 ……**

1. 次の場合のビタミンCの補給

肉体疲労時，妊娠・授乳期，病中病後の体力低下時，老年期

2. 次の諸症状の緩和

しみ，そばかす，日やけ・かぶれによる色素沈着

3. 次の場合の出血予防

歯ぐきからの出血，鼻出血

「ただし，上記2および3の症状について，1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は，医師，薬剤師または歯科医師にご相談ください。」

**…… 用法・用量 ……**

次の量をおのみください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1～2包	2回
7才以上15才未満	1包	
1才以上7才未満	1/2包	
1才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には，保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## …… 成分・分量 ……

シナールEX顆粒は、黄色の顆粒剤で、4包(1.3g×4・成人1日最大量)中に次の成分を含有しています。


成分	含量(4包中)
アスコルビン酸(ビタミンC)	2000mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB <sub>2</sub> 誘導体)	12mg
酢酸 <i>d</i> - $\alpha$ -トコフェロール(天然型ビタミンE)	30mg

添加物として含水二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、粉末還元麦芽糖水アメ、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、スクラロース、ショ糖脂肪酸エステル、香料を含有しています。

- 本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。これは本剤に含まれるビタミンB<sub>2</sub>が吸収利用され、その一部が尿中に排出されるためで心配ありません。
- 本剤の服用により、尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

## …… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



## …… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。

塩野義製薬株式会社「医薬情報センター」

電話：大阪06-6209-6948，東京03-3406-8450

受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)

「副作用被害救済制度」について

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)

®: 登録商標

製造販売元

**塩野義製薬株式会社**

大阪市中央区道修町3丁目1番8号