

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



# ベンザ®調薬A末

## かぜ薬

### 特徴

第2類医薬品

- 生活習慣病で血圧や血糖値、コレステロール値が気になる方にもおすすめの、お体の状態を考えたかぜ薬です。(血圧や血糖値に影響を及ぼすおそれのある成分を含んでいません。)
- 解熱鎮痛成分アセトアミノフェンと4種の生薬(ナンテンジツ、キキョウ、ショウキョウ、チンピ)がバランスよくはたらいて、かぜの諸症状を緩和します。
- 服用しやすい、ジンジャー風味の淡かっ色~かっ色の細粒です。

### ⚠ 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去たん薬

#### 3. 服用前後は飲酒しないこと

#### 4. 長期連用しないこと



#### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。  
高熱
- (5) 次の診断を受けた人。  
心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

#### 3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(裏面へ続く)

## 効能

かぜの諸症状(のどの痛み、悪寒、発熱、頭痛、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

## 用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に、水またはお湯で服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	3回
11歳～14歳	2/3包	
7歳～10歳	1/2包	
3歳～6歳	1/3包	
3歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法・用量を厳守すること。

## 成分

 3包(4.8g、15歳以上の1日服用量)中

はたらき	成分	含量
熱をさげ、痛みを和らげる	アセトアミノフェン	900mg
せきを和らげる	ナンテンジツエキス	636.3mg(乾燥エキスとして) [ナンテンジツ5,000mgより抽出]
たんを和らげる	キキョウエキス	360mg(乾燥エキスとして) [キキョウ2,000mgより抽出]
健胃作用、発汗をうながし、熱をさげる助けをする	ショウキョウエキス	203.9mg(乾燥エキスとして) [ショウキョウ3,000mgより抽出]
健胃作用、せき・たんを和らげる助けをする	チンピエキス	680mg(乾燥エキスとして) [チンピ5,000mgより抽出]

添加物：ケイ酸Ca、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、クロスポビドン、ステアリン酸Mg、スクラロース、アセスルファムカリウム、香料、抽出トコフェロール

<成分に関連する注意>

生薬を用いた製品なので、製品により細粒の色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

## 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (4)1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田コンシューマーヘルスケア株式会社「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-567-087  
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

なお、タケダ健康サイトでは、多くの健康情報や症状・疾患の情報をわかりやすく紹介しています。

タケダ健康サイト

検索

<http://takeda-kenko.jp>

製造販売元  武田コンシューマーヘルスケア株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町四丁目1番1号