

この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

漢方製剤

第2類医薬品

参苓白朮散〔散剤〕35

本方は基本処方の四君子湯に山薬や薏苡仁など6生薬を加えた10生薬で構成されています。

胃腸虚弱の下痢に対する代表処方として用いられます。

● 使用上の注意 ●

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

● 効能・効果 ●

体力虚弱で、胃腸が弱く、痩せて顔色が悪く、食欲がなく下痢が続く傾向があるものの次の諸症：食欲不振、慢性下痢、病後の体力低下、疲労倦怠、消化不良、慢性胃腸炎

● 用法・用量 ●

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。

(食間とは食後2～3時間を指します。)

年齢	1回量		1日服用回数
	分包剤	大入り剤	
成人(15歳以上)	1包	1.5g	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	1.0g	
7歳未満4歳以上	1/2包	0.75g	
4歳未満2歳以上	1/3包	0.5g	
2歳未満	1/4包	0.3g以下	

〔用法・用量に関連する注意〕

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

(裏面につづく)

●成分・分量●		本品3包(4.5g)又は4.5g中	
ニンジン	0.474g	レンニク	0.316g
ビャクジュツ	0.631g	キキョウ	0.316g
ブクリョウ	0.631g	ヨクイニン	0.789g
サンヤク	0.474g	シュクシャ	0.316g
ヘンズ	0.316g	カンゾウ	0.237g

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)分包剤で1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
名古屋市昭和区円上町24-21