

## △ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分、ポビドンヨード(ヨウ素)によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 甲状腺疾患のある人 (3) 2才未満の乳幼児
2. 長期連用しないこと 3. 大量に噴射しないこと

### ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人: 口内のひどいただれ
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起ることがある場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なくしに読めるよう大切に保管してください。使用期限(パッケージ底面及び容器ラベルに記載)を過ぎた製品は使用しないこと

### 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、キャップをしっかりとめて立てて保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 火気に近づけないこと(エタノール含有物)

●使用後は、必ずキャップをしてノズルをもとの位置にもどして保管すること ●携帯する場合は、添付のビニール袋に入れること ●使用中に薬液がこぼれ衣類等が着色したら、すぐに水洗いすること ●液が出ないときは、液が出るまでくり返し押すこと。またノズルの先端を針等でつかないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

### ＼あつらいいな／をカタチにする

発売元 **小林製薬株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先 (お客様相談室)

**0120-5884-01**

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

Throat Disinfectant **第3類医薬品**

口腔咽喉炎

販売名: のどぬーるスプレーキッズC  
(効能・効果) のどの炎症によるのどあれ・のどいたみ・のどはれ・のどの不快感・声がれ  
(用法・用量) 1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) ノズルをのどの患部におむけて、軽く息をはきながら噴射すること(息を吸いながら使用することがある) (2) 小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること (3) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医師の診療を受けること (4) のど用のみ使用すること (5) 薬液を誤って大量に飲み込んだときは、直ちに医師の診療を受けること

〔成分・分量〕 100mL中

ポビドンヨード……………0.45g  
添加物として、ヨウ化K、グリセリン、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、1-メントール、香料を含有する

**火気厳禁** 第二石油類 危険等級Ⅲ  
エタノール含有物 水溶性



副作用被害救済制度  
☎0120-149-931