

# チルコール® 溶かして飲むかぜ薬

**チルコール® 溶かして飲むかぜ薬**はお湯又は水に溶かして飲むタイプの服用しやすい、しょうが味の総合かぜ薬です。

解熱鎮痛効果のあるアセトアミノフェンをはじめ、くしゃみ・鼻水・鼻づまりをおさえる抗ヒスタミン剤、せきをしずめる2種の鎮咳成分、発熱で失われやすいビタミンC、去痰作用のあるカンゾウエキスを配合し、かぜの諸症状を緩和します。

ノンカフェイン処方です。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- (3) 15才未満の小児

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等  
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがある)

#### 4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

#### 5. 服用前後は飲酒しないでください

#### 6. 長期連用しないでください



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 次の症状のある人  
高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

関係部位	症状
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる

間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒（発熱によるさむけ）、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

### 用法・用量

次の量を約100mLのお湯又は水に溶かして、食後なるべく30分以内に服用してください

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
15才未満	服用しないこと	

### <用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を厳守してください
- お湯に溶かして服用する場合は、やけどに気をつけてください
- 本剤は、服用直前にお湯又は水に溶かして服用してください。また、何回分かをまとめて溶かし、保存するようなことはしないでください

### 成分・分量

成人1日量（3包）中に次の成分を含んでいます

成分	含量	はたらき
アセトアミノフェン	900mg	かぜに伴う熱を下げ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みをやわらげます
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみをおさえます
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せきをおさえます
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	せきをしずめ、たんを出しやすくします
アスコルビン酸(ビタミンC)	500mg	かぜのときに消耗しやすいビタミンCの補給
カンゾウ乾燥エキス	70mg (原生薬として500mg)	たんの切れをよくします
ショウキョウ乾燥エキス	50mg (原生薬として300mg)	発汗を促し、かぜの回復を助けます


添加物としてアスパルテム（L-フェニルアラニン化合物）、白糖、D-ソルビトール、ポビドン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、香料を含有しています


### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わる）
- 本剤は吸湿しやすい製剤です。1包を開封後は速やかに服用してください。また、開封状態で置いておくと粒が変色することがあります。変色した場合は服用しないでください
- 使用期限をすぎた製品は服用しないでください

### 本製品についてのお問合せ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室  
住所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16  
電話：(03)3370-7174（代表）  
受付時間：午前9:00 から午後5:00まで（土、日、祝日を除く）

発売元  日邦薬品工業株式会社  
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元  日東薬品工業株式会社  
京都府向日市上植野町南開35-3