

ここから



手前に引きながら切ってください



手前に引きながら切ってください



段差がついてつかみやすく開けやすい



なみなみカット

セルフメディケーション

税 控除 対象

# ロキソプロフェンNa<sup>※</sup>配合

## 肩・腰の痛み

経皮鎮痛消炎剤

第2類医薬品

# パスタイン<sup>®</sup> Lx

テープ 微香性



24時間持続

※水和物として 7cm×10cm

### 効能・効果

腰痛,肩こりに伴う肩の痛み,関節痛,筋肉痛,腱鞘炎(手・手首の痛み),肘の痛み(テニス肘など),打撲,捻挫

### 用法・用量

表面のライナー(フィルム)をはがし,1日1回患部に貼付する。

<用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。(2)本剤は,痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく,痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので,症状がある場合だけ使用してください。(3)1日あたり4枚を超えて使用しないでください。(4)汗をかいたり,患部がぬれている時は,よく拭き取ってから使用してください。(5)皮膚の弱い人は,使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に,1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り,発疹・発赤,かゆみ,かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

### 成分・分量 膏体100g中 [1枚あたり(7cm×10cm) 膏体量1g]

ロキソプロフェンナトリウム水和物…5.67g (無水物として5g)  
添加物: L-メントール, スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体, ポリイソブチレン, 脂環族飽和炭化水素樹脂, 流動パラフィン, ジブチルヒドロキシトルエン, その他5成分

### 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)品質保持のため,開封後の未使用分は袋に入れ,袋のチャックをきちんと閉めて保管してください。(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また,アルミ袋を開封した後は,なるべく早く使用してください。



表面の矢印から開封してください。(裏面から切ると段差がつきません。)

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

経皮鎮痛消炎剤

**パスタムLX** 第2類医薬品

品番：PLX7

包装 7cm×10cm

使用開始日をご記入ください。

**チャック** 開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

年 月 日

**⚠ 使用上の注意**

**❌ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください。  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人(3)15歳未満の小児
- 次の部位には使用しないでください。  
(1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口  
(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部
- 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。
- 連続して2週間以上使用しないでください。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください)

**■ 相談すること**

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3)妊婦又は妊娠していると思われる人(4)高齢者(5)次の診断を受けた人 気管支ぜんそく
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性が


ありますので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 使用后、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢・軟便
- 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(他の疾患の可能性もあります)

製造販売元  **祐徳薬品工業株式会社**

佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1  
[お客様相談窓口] TEL.0954-63-1320  
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

日本製

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/>  
☎0120-149-931