

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

アレルギー用薬

アレジンAZ錠

第2類医薬品

アレジンAZ錠は、花粉やハウスダスト等によるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりや、食物等のアレルギーによる皮膚のはれ、かゆみの緩和に効果を発揮します。また症状の軽い早めの時期からの服用が効果的です。

かぜ等の鼻炎症状や虫さされ・化膿等による皮膚のはれ、かゆみには使用しないでください。

症状がアレルギーによるものかどうかわからない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
1. 次の人は服用しないでください
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)15才未満の小児。
 - (3)妊娠又は妊娠していると思われる人。
 2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
 - 他のアレルギー用薬(皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む)、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳祛痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬)
 3. 服用前後は飲酒しないでください
 4. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)
 5. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
 6. 長期連用しないでください

▣ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)高齢者。
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4)アトピー性皮膚炎、又はアトピー・素因があると診断を受けた人。
 - (5)気管支ぜんそくの診断を受けた人。
 - (6)発熱やせき、黄色で粘りのある鼻みずなどのかぜ症状がある人。
 - (7)鼻炎の場合でアレルギー性鼻炎か、かぜによる鼻炎かわからない人、又は、皮膚の症状が「じんましん・湿疹・かぶれ」によるものか、虫さされや化膿等他の原因によるものかわからぬ人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤
消 化 器	吐き気・嘔吐、口内及び口周囲のあれ、食欲不振、胸やけ、胃部不快感、腹痛
精神神経系	倦怠感、めまい、頭痛、手足のしびれ
循 環 器	動悸
呼 吸 器	息苦しさ
泌 尿 器	頻尿、排尿困難、血尿
肝 臓	全身のだるさ、皮膚や白目が黄色くなる
そ の 他	顔面のほてり、鼻乾燥、浮腫、月経異常

(裏面もお読みください。)

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

□のかわき、便秘、下痢、眠気
4. じんましん・湿疹・かぶれなどの皮膚の症状の場合で、症状の軽減が見られるが繰り返し症状が起こるなど1週間以上症状が継続する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 鼻炎の症状の場合で2週間以上服用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して服用してください

効能・効果

- 花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻みず、鼻づまり
○じんましん・湿疹・かぶれによる次の皮膚の症状の緩和:皮膚のはれ、かゆみ

用法・用量

次の量を朝食後及び就寝前に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人(15才以上)	2錠	2回
15才未満	服用させないこと	

<用法・用量に間違する注意>

- (1)鼻炎の症状に用いる場合は1週間、皮膚の症状に用いる場合は3日間服用しても症状の改善が見られない場合には服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- (2)花粉など季節性のアレルギー性鼻炎による症状に使用する場合は、花粉飛散期に入つて症状が始めたら、症状の軽い早めの時期からの服用が効果的です。
- (3)早めにのみこんでください。長く口中にとどめると苦味を感じことがあります。これは成分自身の苦味によるものです。また、服用後にも苦味を感じことがあります。
- (4)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思ひぬ事故につながります。)



成分・分量 4錠(成人1日量)中

成 分	分 量	は た ら き
アゼラスチン塩酸塩	2mg	アレルギー症状の原因となるヒスタミンやロイコトリエンなどの作用を抑えて、鼻や皮膚のアレルギー症状を緩和します。

添加物として乳糖、D-マンニトール、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、マクロゴール、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、酸化チタン、タルクを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

くすり相談窓口:電話 076-435-5055
午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 第一薬品工業株式会社

富山市草島15-1