

ひきはじめのかぜに

体力中等度以上の方の

感冒の初期

鼻かぜ

頭痛

眠くなる成分を含まない



第2類医薬品

カコナール



(お問い合わせ先) 第一三共ヘルスケア(株)

電 話03(5205)8331 受付時間9:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/

販売元

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社 東京都中央区日本橋3-14-10

新生薬品工業株式会社 奈良県高市郡高取町清水谷1269

使用前にこの箱の説明文書を 必ずお読み下さい。 また、必要な時に読めるよう大 切に保管して下さい。



カコナール

第2類医薬品

水製抽出液葛根湯

使用上の注意相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8)次の症状のある人:むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症	
偽アルド ステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感 やこわばりに加えて、脱力感、筋肉 痛があらわれ、徐々に強くなる。	
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。	

- 3.1カ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- 4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

[効能・効果]

体力中等度以上のものの次の諸症 感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、 頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

[用法・用量]

次の量を食間に服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3 🗆
15歳未満	服用しないで下さい。	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守して下さい。 (2) 本剤は1回1本飲みきりです。 (3) 本剤は本質的に沈殿を含んでいます。よく振ってから服用して下さい。

[成分·分量] 90mL(30mL×3本)中

葛根湯抽出液(下記生薬の水製抽出液)・・・90mL

日局カッコン…8g 日局マ オ ウ…4g 日局タイソウ…4g 日局ケ イ ヒ…3g 日局シャクヤク…3g 日局カンゾウ…2g 日局ショウキョウ…1g

添加物:D-ソルビトール、白糖、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、エタノール

[保管及び取扱い上の注意]

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。