

押して開ける

⚠ 使用上の注意

本剤はカンジダ症の治療薬ではありません。フェミニーナ腔カンジダ錠等カンジダ治療薬と併用しないでください

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと: カンジダ症の人
2. 次の部位には使用しないこと: 目の周囲、粘膜等

👨‍⚕️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(4)湿潤やただれのひどい人(5)乳幼児
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

(右側面につづく)

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合
は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

第2類医薬品

販売名: フェミニーナミスト

鎮痒消炎薬 Anti-Itch Spray

効能・効果

かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、皮ふ炎、じんましん、あせも、ただれ、しもやけ

用法・用量

1日数回、患部に適量を塗布(噴霧)してください

<用法・用量に関連する注意>

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること(3)外用にのみ使用すること●同じ部位に他の外用剤との併用はさけること●患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと●1回2～3噴霧を目安に患部に届くように適量を噴霧すること

税 控除 対象



4 987072 065945

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要となきに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

成分・分量 100g中 ジブカイン塩酸塩 0.3g、ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g、ベンゼトニウム塩化物 0.1g 添加物として、グリセリン、ベンザルコニウム塩化物、エドト酸Naを含有する

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップをしっかりとめて保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)●はじめて使用するときは、必ず液が出るまで数回空押ししてください●残量が少なくなった場合、倒立(逆さ)使用では噴霧しにくくなりますが、その場合には、正立で空噴きすると噴霧できるようになります

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

▼ あつらいいな / をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-10-30



MADE IN JAPAN 10200749