

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

製品情報はこちから

スクラート

検索

第2類医薬品

胃痛・胃酸の逆流などで胸がやける 荒れた患部を直接修復

スクラートG <胃腸薬>

水なしで飲む
液タイプ

有効成分を荒れた患部に直接届けます。
スープとした爽快感がすばやく広がります。

●痛みのもと(粘膜の荒れた患部)を直接保護・修復します

スクラルファートが荒れた患部に直接貼りついで、胃酸などの攻撃から保護するとともに、患部を修復して、もとから治していきます。

●すばやく、かつ持続的に胃酸を中和します

メタケイ酸アルミニン酸マグネシウムと合成ヒドロタルサイトが胃酸をすばやくかつ持続的に中和して粘膜への刺激を軽減します。

●2つの生薬が胃の働きを助けます

コウボクとソウジュツが胃の働きを高め、胃酸の排出を助けます。

△ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 長期連続して服用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 次の診断を受けた人。
腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口の渇き、吐き気
3. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



(必ず裏面もお読みください)

効能

胃痛、胸やけ、胃酸過多、げっぷ(おくび)、もたれ(胃もたれ)、胃重、胃部膨満感、胃部不快感、胸つかえ、飲み過ぎ(過飲)、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、嘔気、恶心)、嘔吐

用法・用量

次の量を**食前または食間・就寝前に**服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
15才未満	×服用しないでください	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 中身をしづり出すように服用してください。

成分 1日服用量(3包・17.4g)中

スクラルファート水和物 ······ 1500mg
メタケイ酸アルミニン酸マグネシウム ······ 1500mg
合成ヒドロタルサイト ······ 750mg
コウボク流エキス ······ 0.6mL
(原生薬換算量 ······ 0.6g)
ソウジュツ流エキス ······ 0.6mL
(原生薬換算量 ······ 0.6g)

添加物として、キサンタンガム、アルギン酸プロピレングリコールエステル、乳酸、炭酸水素Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、エタノール、スクラロース、l-メントール、香料を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

■お問合せ先

お買い求めのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社
〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28

0123